

**PREGUNTAS DE REFERENCIA PARA EL EXAMEN DE FIN DE
CARRERA**

ÁREA DE ECONOMETRÍA

REACTIVOS

- 1) Bajo las hipótesis de Gauss-Markov, los estimadores de MCO son insesgados, esto implica que incluir una variable irrelevante u omitir una variable relevante tendrá el siguiente efecto, respectivamente:
- a) No tendrá ningún efecto en el primer caso y si sesgará los estimadores del segundo caso.
 - b) En los dos casos se obtendrá estimadores sesgados.
 - c) No tendrá ningún efecto sobre el sesgo de los estimadores en ambos casos.
 - d) Tendrá un efecto en el sesgo en el primer caso y no afectará los resultados de la estimación el segundo caso.

Respuesta: a

- 2) Una medida de la calidad del ajuste de una estimación realizada con un modelo de regresión lineal múltiple es el R^2 . Esta medida explica:
- a) La proporción de la variación muestral en la variable dependiente que se explica por las variables independientes.
 - b) La proporción de la variación muestral de la variable independiente de interés explicada por la variable dependiente.
 - c) La proporción de la variación muestral de las variables independientes explicada por la variable dependiente.
 - d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta: a

- 3) En un modelo de regresión lineal múltiple $Y = X\beta + \mu$ se dice que $\hat{\beta}$ es un estimador insesgado de β cuando:
- a) $E(\hat{\beta}) = 0$
 - b) $E(\hat{\beta}) = \sigma^2 I$
 - c) $E(\hat{\beta}) \neq 0$
 - d) $E(\hat{\beta}) = \beta$

Respuesta: d

- 4) En un modelo de regresión lineal múltiple $Y = X\beta + \mu$ los supuestos de Gauss-Markov son:
- Linealidad $Y = X\beta + \mu$, X es matriz aleatoria, Esperanza nula $E(\mu) = 0$, Homoscedasticidad y no correlación serial $V(\mu) = \sigma^2 I$ y no multicolinealidad $\rho(X) = K$.
 - Linealidad $Y = X\beta + \mu$, X es matriz determinística, Esperanza nula $E(\mu) = 0$, Homoscedasticidad y no correlación serial $V(\mu) = \sigma^2 I$ y multicolinealidad $\rho(X) \neq K$.
 - Linealidad $Y = X\beta + \mu$, X es matriz determinística, Esperanza nula $E(\mu) = 0$, Homoscedasticidad y no correlación serial $V(\mu) = \sigma^2 I$ y no multicolinealidad $\rho(X) = K$.
 - Linealidad $Y = X\beta + \mu$, X es matriz determinística, Esperanza constante $E(\mu) = \alpha$, Homoscedasticidad y no correlación serial $V(\mu) = \sigma^2 I$ y multicolinealidad $\rho(X) = K$.

Respuesta: c

- 5) Sea Y_t un proceso ARMA (p, q). Entonces, se puede afirmar que:
- La verificación de los residuos de ese modelo sigue el mismo proceso usado para la identificación del modelo, pero las funciones de autocorrelación simple y compuesta deben ser interpretadas de forma contraria.
 - La verificación de los residuos de ese modelo implica la identificación de un proceso ruido blanco.
 - La verificación de los residuos de ese modelo no es necesaria, pues el modelo ya está estimado.
 - Si las funciones de autocorrelación simple y parcial de los residuos decaen exponencialmente significa que el modelo está bien especificado.

PROBLEMA

Suponga que x_t es un proceso AR (p) y que v_t es un ruido blanco, independiente de $x_{t-j}, \forall j$. Demuestre que el modelo $y_t = x_t + v_t$ es un proceso ARMA (p, p).